L'ESPERIMENTO PIU' BELLO DELLA FISICA

Introduzione al corso

Olivia Levrini, DIFA, UNIBO
Giorgio Lulli, CNR-IMM, Bologna

Persone coinvolte e Programma del Corso

- Lezione 1: Introduzione all'esperimento di interferenza di elettroni singoli: dal dialogo Bohr-Einstein alla realizzazione dell'esperimento (Olivia Levrini, Giorgio Lulli)
- Lezione 2: Laboratorio sull'interferenza delle onde alla superficie di un liquido e sull'interferenza della luce (Barbara Pecori)
- Lezione 3: Esperimenti sul comportamento ondulatorio degli elettroni con un microscopio elettronico (Giorgio Matteucci)
- Lezione 4: La "Quantistica": Dall'esperimento più bello all'esplorazione di nuove fenomenologie (Giorgio Lulli, Vittorio Monzoni)
- Lezione 5: La "Quantistica": un nuovo capitolo della fisica (Elisa Ercolessi, Vittorio Monzoni)
- Lezione 6: Entanglement e applicazioni della fisica quantistica (crittografia, teletrasporto e computer quantistici) (Eugenio Bertozzi)

**DI CHE
ESPERIMENTO SI
TRATTA?**

**...PERCHE' SI DICE
CHE E' IL "PIÙ
BELLO"?**

L'esperimento della doppia fenditura di Young con elettroni

Da "The Fabric of Cosmos pt. 3 *Quantum Leap*" (Brian Greene)

“Decidemmo di esaminare un fenomeno [l'interferenza di elettroni singoli] che è impossibile, assolutamente impossibile spiegare in modo classico, e che sta al cuore della meccanica quantistica. In realtà contiene l'unico mistero.”

Richard Feynman
(1918-1988)

1963: Feynman: bello, ma ... “**impossibly small**”

... perché?

Vi avvertiamo subito di non cercare di montare questo esperimento (come invece avreste potuto fare con i due che abbiamo già descritti). Questo esperimento non è mai stato fatto in questo modo. Il guaio sta nel fatto che, per rivelare gli effetti che ci interessano, l'apparato dovrebbe essere costruito su una scala talmente piccola da rendere impossibile la cosa. Noi stiamo quindi compiendo un “esperimento concettuale” e lo abbiamo scelto così perchè è facile ragionarci su. Noi sappiamo quali sono i risultati che *si otterrebbero*, perchè *sono stati fatti* molti esperimenti, in cui la scala e le proporzioni erano state scelte in modo da mettere in luce gli effetti che ora descriveremo.

L' esperimento di Merli-Missiroli-Pozzi (1974-76)

P. G. Merli, G. F. Missiroli, G. Pozzi, "On the statistical aspect of electron interference phenomena", *American Journal of Physics*, 44, 3, 306-307 (1976)

l'esperimento più bello della fisica

<http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/>

+ BOOKMARK

March 10, 2011

di che si tratta

spiegazione

storia

bellezza

backstage

pensare

il film

Benvenuti nel sito "L'esperimento più bello della fisica".

Esso vi guiderà alla scoperta di un esperimento di fisica che, nel 2002 è stato definito il più bello di tutti i tempi da un sondaggio della rivista *Scientific American*. Nel secolo scorso come esperimento "mentale" per illustrare un effetto sorprendente della fisica quantistica (l'apparente "doppio" comportamento onda-particella dell'elettrone) venne per molto tempo ritenuto impossibile a farsi a causa di difficoltà tecniche. Nel 1976 un gruppo di ricercatori italiani (Pier Giorgio Merli, Gian Franco Missiroli e Giulio Pozzi) superando

(2009)

<http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/>

Interferenza di elettroni singoli: l'esperimento "più bello" della fisica

Nel 2002 un sondaggio della rivista *Physics World* identificò l'esperimento di interferenza di elettroni singoli come il più bello nella storia della fisica. Proposto da Einstein nel 1927 come esperimento "mentale" per illustrare un effetto sorprendente della fisica quantistica (il duplice comportamento onda-particella degli elettroni e della luce) esso fu per molto tempo ritenuto impossibile a farsi a causa di difficoltà tecniche. Dopo una serie di progressi a cui contribuirono vari gruppi di ricerca, nel 1976 tre fisici italiani (**Pier Giorgio Merli, Gian Franco Missiroli e Giulio Pozzi**) riuscirono a superare le ultime difficoltà che esistevano e, utilizzando un microscopio elettronico opportunamente modificato, realizzarono l'esperimento di interferenza con elettroni singoli, pubblicandone il primo resoconto sull'*American Journal of Physics*. Sempre nel 1976 su questo esperimento fu realizzato un film didattico-divulgativo: "Interferenza di elettroni", che ebbe immediato successo, vincendo il primo premio al Festival Internazionale del Cinema Scientifico tenutosi a Bruxelles nel 1976.

A 35 anni dalla sua realizzazione il film "Interferenza di elettroni" è oggi riproposto in versione rimasterizzata (a cura della **Cineteca di Bologna**). Lo accompagna un documentario originale che, attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti, narra la vicenda di questo esperimento, evidenziando i vari fattori (storici, umani, tecnici) che portarono alla sua realizzazione.

Questo progetto è dedicato al ricordo di Pier Giorgio Merli, uno dei tre ricercatori che realizzarono l'esperimento, prematuramente scomparso nel 2008.

Contenuti

"Interferenza di elettroni" (1976) edizione rimasterizzata nel 2010, durata 14', formato PAL 4/3 720x576, versioni in lingua italiana e inglese

"L'esperimento più bello" (2011) durata 25', formato PAL 16/9 1280x720, lingua italiana.

"La passione, il metodo, l'esempio. Vittorio Morandi ricorda Pier Giorgio Merli" (2011) durata 4', formato PAL 16/9 1280x720, lingua italiana.

Progetto realizzato con contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca - Legge 6/2000 per la diffusione della Cultura Scientifica

Realizzazione: Clivis - Bologna

gruppo design e design lab 2011

interferenza di elettroni - l'esperimento più bello

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi
(IMM) Sede di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI FISICA

interferenza di elettroni

Medaglia d'Oro al Festival Internazionale del Cinema Scientifico - Bruxelles 1976

Edizione rimasterizzata del film "Interferenza di elettroni" (1976) di Pier Giorgio Merli, Gian Franco Missiroli, Lucio Morettini, Dario Nobili e Giulio Pozzi. Contiene il documentario: "L'esperimento più bello", realizzato a cura di Diego L. Gonzalez, Olivia Levrini, Giorgio Lulli, Dario Zanasi. Regia: Dario Zanasi, Diego L. Gonzalez.

Coordinamento del progetto: Giorgio Lulli

copia omaggio vietata la vendita

(2011)

APQEO | MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
L'avventura della ricerca

GIORGIO LULLI
L'ESPERIMENTO PIÙ BELLO

L'interferenza di elettroni singoli e il mistero della
meccanica quantistica

Interferenza di elettroni singoli: è stato giudicato "l'esperimento
più bello" nella storia della fisica.

Albert Einstein l'aveva immaginato per primo; Richard Feynman
l'aveva ritenuto "impossibile".

Poi un giorno tre ricercatori di Bologna lo hanno realizzato,
permettendoci di vedere con i nostri occhi il mistero
fondamentale che sta al cuore della meccanica quantistica.
Questo libro è il racconto della loro straordinaria avventura
scientifica.

*Vedere l'esperimento delle due fenditure realizzato è come guardare
una eclissi totale di sole per la prima volta.*

- Allison Campbell (St. Andrew University)

www.apqeoonline.com/education

euro 15,00

GIORGIO LULLI **L'ESPERIMENTO PIÙ BELLO**

APQEO

APQEO | MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

GIORGIO LULLI
**L'ESPERIMENTO
PIÙ BELLO**

L'interferenza di elettroni singoli
e il mistero della
meccanica quantistica

(2013)

Struttura del Corso

FILO 1

Lezione 2: Laboratorio sull'interferenza delle onde alla superficie di un liquido e sull'interferenza della luce (Barbara Pecori)

Lezione 3: Esperimenti sul comportamento ondulatorio degli elettroni con un microscopio elettronico (Giorgio Matteucci)

FILO 2

Lezione 4: La "Quantistica": Dall'esperimento più bello a nuove fenomenologie (Giorgio Lulli, Vittorio Monzoni)

Lezione 5: La "Quantistica": un nuovo capitolo della fisica (Elisa Ercolessi, Vittorio Monzoni)

Lezione 6: Entanglement e applicazioni della fisica quantistica (crittografia, teletrasporto e computer quantistici) (Eugenio Bertozzi)

FILO 1

La sfida sperimentale

- Come è stato possibile realizzare un esperimento che Feynman riteneva *impossibile*?
- Quali problemi tecnici sono stati risolti per portarlo a termine?

FILO 2

La sfida concettuale

- Come è possibile spiegare un fenomeno che appare tanto misterioso?
- Qual è l'essenza del fenomeno e quale logica sta dietro a tutto questo?

FILO 1

la sfida sperimentale

- Come è stato possibile realizzare un esperimento che Feynman riteneva *impossibile*?
- Quali problemi tecnici sono stati risolti per portarlo a termine?

LE TAPPE

Lezione 2

- Quali sono le condizioni fisiche e geometriche che permettono di osservare un fenomeno di interferenza?
- Perché con onde meccaniche e con la luce tali condizioni si possono realizzare (più o meno facilmente), mentre con gli elettroni diventa problematico?

Lezione 3

- Come è stato possibile realizzare l'esperimento?
- Quali problemi tecnici si sono dovuti affrontare e come sono stati risolti?
- Che cos'è e perché l'utilizzo di un microscopio elettronico ha permesso la realizzazione dell'esperimento?
- Che tipo di creatività ci è voluto? Quali sono state le idee "brillanti"?
- Con le tecnologie di oggi cosa si può fare?

FILO 2

La sfida concettuale

- Come è possibile spiegare un fenomeno che appare tanto misterioso?
- Qual è l'essenza del fenomeno e quale logica sta dietro a tutto questo?

LE TAPPE

Lezione 4

- Dall'EBP a nuove fenomenologie: Quali aspetti fenomenologici rivelano con semplicità un'essenza "genuinamente" quantistica?

Lezione 5

- Quale nuova logica è possibile costruire per spiegare e interpretare ciò che si osserva?

Lezione 6

- Quali estensioni e implicazioni ha questa nuova logica?

Introduzione al Filo 1: Visione del DOCUMENTARIO con “consegna”

Quali elementi dà il film per rispondere alle domande portanti del filo 1?

(Come è stato possibile realizzare un esperimento che Feynman riteneva impossibile? Quali problemi tecnici sono stati risolti per portarlo a termine?)

play movie

$$\lambda = h/mv$$

1927

C. Daviss

Elettroni (54)
Distanza inte

1927

1963: Feynman: bello, ma **impossibile** ("...impossibly small")

Richard Feynman (1918-1988)
"Decidemmo di esaminare l'idea che è impossibile spiegare in modo classico che sta al cuore della meccanica quantistica. In realtà con il mistero. [...] Nel raccontarvi delle peculiarità di tutta la meccanica quantistica"

$\tau = 1/25$

- (1) Dipartimento
- (2) CNR

$\tau = 60$ s

Giulio

phy

1971

1974

maggio 2002

settembre 2002

The most beautiful experiment...
May 2, 2002
What is the most beautiful experiment in physics? Robert P

phy

Una versione recente (2011), tecnologicamente avanzata dell'esperimento, con le fenditure al posto del biprisma e un rivelatore di elettroni singoli a memoria veloce (lez. 3 Prof. Matteucci).

C. Jönsson (Univ. Tubinga) 1961

1961

L'esperienza d'interferenza da due fenditure eseguita con elettroni è un esperimento fondamentale che può essere usato per introdurre molti dei concetti e degli apparenti paradossi della fisica quantica. Per decenni è stato presentato come un esperimento concettuale le cui previsioni erano giustificate dalla loro relazione remota e per molti versi oscura con esperimenti reali in cui gli elettroni sono diffratti dai cristalli. Pochi trattati anche moderni mostrano di essere a conoscenza che l'esperimento è stato realizzato e che i risultati sono in accordo con le previsioni della fisica quantica in tutti i suoi dettagli... Al di là delle difficoltà tecniche, tuttavia, rimane la semplicità concettuale di un esperimento fondamentale, reale, pedagogicamente pulito, la cui descrizione e studio può ora arricchire e semplificare l'apprendimento della fisica quantica...

Fig. 5. Electron micrograph of the slit line of material.

frangere ma non singoli elettroni

storia in breve
dell'esperimento più
bello della fisica

$$\lambda = h/mv$$

1927

C. Daviss

Elettroni (54)
Distanza inte

rivelatore di elettroni

C. Jönsson (Univ. Tubinga) 1961 1961

1963: Feynman: bello, ma *impossibile* (“...impossibly small”)

Richard Feynman (1918-1988)

“Decidemmo di esaminare l'effetto che è impossibile spiegare in modo classico, che sta al cuore della meccanica quantistica. In realtà con il nostro esperimento abbiamo scoperto un mistero. [...] Nel raccontarvi questo esperimento vi sto raccontando una delle peculiarità di tutta la meccanica quantistica”

K.H. Hermann (Siemens) Intensificatore di immagine (1971)

1974

maggio 2002

The most beautiful experiment...

May 2, 2002

What is the most beautiful experiment in physics? Robert P.

Giulio

- (1) Dipartimento di Fisica
- (2) CNR

settembre 2002

Top 10 beautiful experiments

The list below shows the top 10 most

FENDITURE

2011

larghezza 100nm

E-Beam	Spot	Mag	FWD	Tilt	Det	Scale
5.00 kV	3	80.0 kX	5.004	-0.0	TLD-S	1 μm
						9pA, 80kX, 0.05x1.5, 1.7" parallel

Una versione recente (2011), tecnologicamente avanzata dell'esperimento, con le fenditure al posto del biprisma e un rivelatore di elettroni singoli a memoria veloce (lez. 3 Prof. Matteucci).

Lunghezza d'onda elettroni

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v}$$

h : costante di Planck

$$eV = \frac{m_0 v^2}{2}$$

$$m_0 v = (2m_0 eV)^{1/2}$$

$$\lambda = \frac{h}{(2m_0 eV)^{1/2}}$$

$$\lambda = \frac{h}{[2m_0 eV (1 + \frac{eV}{2m_0 c^2})]^{1/2}}$$

(relativistica)

$$\lambda = \frac{12.66}{(1 + 0.9788 \times 10^{-6} V) V^{1/2}}$$

V (volt) $\rightarrow$ λ (nm)

tensione accelerazione (volt)	lunghezza d'onda	
1	1.266 nm	1.266×10^{-9} m
100	0.1266 nm	1.266×10^{-10} m
100000	0.0037 nm	3.7×10^{-12} m

Lunghezza d'onda elettronici

elettroni

$$\lambda_{el} \sim 10^{-3} - 10^{-5} \lambda_{light}$$

100 keV 1 eV

Il problema della *visibilità* delle frange

$$\updownarrow \quad x \approx \lambda D/d \quad (d \ll D)$$

x (potere risolutivo
occhio) $\approx$ **0.1 mm**

$$\lambda_{\text{elettroni}} = \mathbf{0.0034 \text{ nm}}$$

$$d \sim \mathbf{300 \text{ nm}} \quad (0.3 \mu\text{m})$$

$$D = xd/\lambda \approx \mathbf{100 \text{ m}}$$

On
 Off
 Impulso

Lunghezza d'onda

Ampiezza

PhET

4170.99 nm

Mostra grafico

schermo

posizione

intensità

Metro
 Cronometro

Aggiungi rivelatore

Reset

Rotazione vista

Alto Lato

One Light
 Two Lights

Spaziatura

0 nm 2100 4200

Senza barriere
 Una barriera
 Due barriere

Larghezza barriere

0 nm 1050 2100

Posizione barriera

0 nm 2590 5250

Separazione barriere

0 nm 1750 3500

Aggiungi specchio

$$\lambda \approx 0.45 \mu\text{m}$$

larghezza fenditure $\approx 0.4 \mu\text{m}$

distanza tra fenditure $\approx 1.9 \mu\text{m}$

distanza tra i massimi di interferenza $\approx 0.6 \mu\text{m}$

Il problema della *coerenza* delle sorgenti

coerenza **figura di interferenza *stabile* nel tempo**

sorgenti ***coerenti*** = che emettono onde di uguale frequenza/lunghezza d'onda e *sincronizzate* tra loro (*con differenza di fase costante*)

facile ottenerle negli esperimenti con le onde in acqua, molto meno per sorgenti standard di luce o di elettroni

L'esperimento delle due fenditure con l'ondoscopio

Sorgente di onde rettilinee

Fenditure

Nella regione dopo le fenditure si osserva una situazione identica a quella vista prima

.. ma perchè complicare le cose con le 2 fenditure?

Coerenza delle sorgenti di elettroni

Per motivi legati ai meccanismi fisici di emissione, le sorgenti di elettroni (come quelle tradizionali di luce) *non* sono di solito coerenti.

Problemi:

- la frequenza (lunghezza d'onda) non è costante nel tempo (non vengono emessi treni continui monofrequenza - energia, ma “pacchetti” di onde) (problema della **coerenza temporale**)
- l'emissione è un processo *statistico* (casuale); sorgenti diverse, ma anche punti diversi di una unica sorgente estesa, emettono in modo scorrelato, ovvero con differenza di fase variabile (problema della **coerenza spaziale**)

Coerenza delle sorgenti di luce e elettroni

Dato che sorgenti distinte sono tipicamente incoerenti, si lavora con una *sorgente singola* sdoppiandola con le due fenditure (*metodo di Young*)

Coerenza temporale

(sorgente puntiforme
quasi-monocromatica)

coerenza spaziale:
sorgente estesa **incoerente**

$$\frac{dL}{R} < \frac{\lambda}{2}$$

condizioni di coerenza

In sintesi

Esigenze di *visibilità delle frange* e di *coerenza* imporrebbero una geometria in cui:

- ~~• dimensione sorgente primaria, larghezza fenditure, distanza tra le fenditure sono simili alla lunghezza d'onda~~

(condizioni praticamente impossibili viste le lunghezze d'onda degli elettroni), oppure, in alternativa ...

- **distanze sorgente-fenditure e fenditure-schermo rivelatore molto grandi** (*centinaia di metri!*)

anche queste condizioni non sembrano facili, ma per fortuna c'è un "trucco" per realizzarle restando entro uno spazio limitato ...

**“lenti”
elettroniche**

FIG. 6. Electron-diffraction apparatus.

lente elettro-magnetica per elettroni

il costituente fondamentale del
microscopio elettronico (in trasmissione)

Effetto di una lente

proiezione geometrica da sorgente puntiforme

Effetto di una lente

immagine delle stesse dimensioni del caso precedente, ma molto più vicina all'oggetto (e ribaltata ...)

biprisma elettronico (Möllensted, Düker)

Tubinga (1955)

biprisma di Fresnel (luce)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI FISICA
INV. N° 13661

F
P

spessore del filo $\approx 0.5 - 1 \mu\text{m}$

Interferenza di elettroni nel microscopio elettronico

K.H. Hermann (Siemens) Intensificatore di immagine (1971)

$\tau = 1/25 \text{ s}$

$\tau = 10 \text{ s}$

$\tau = 20 \text{ s}$

$\tau = 60 \text{ s}$

$\tau = 120 \text{ s}$

**Il primo rivelatore di
elettroni singoli**

Esperimento Merli Missiroli Pozzi (1976)

microscopio elettronico + biprisma + rivelatore elettroni singoli

Il primo esperimento di interferenza in cui si visualizzano i singoli elettroni: **l'esperimento più bello!** (*Physics World 2002*)

Il primo esperimento di interferenza di elettroni singoli con 2 fenditure

Una realizzazione recente (2011) dell'esperimento, con le **fenditure** al posto del biprisma e un rivelatore di elettroni singoli a memoria veloce (lez. 3 Prof. Matteucci) .

Introduzione al Filo 2 – La sfida concettuale

ovvero

come la fenomenologia impone di liberarsi
progressivamente da immagini e categorie di
pensiero che sembrano ovvie...
...e di costruirsi delle nuove.

La DINAMICA del RAGIONAMENTO

1. Individuazione, nell'EPB, di alcuni limiti (confini) del “pensare classico”, ovvero individuazione di alcune situazioni emblematiche in cui il “pensare classico” *non* arriva (**apertura dello spazio del problema**).
2. Allargamento della fenomenologia (analisi di altri esperimenti con altri oggetti) per mettere a fuoco aspetti/comportamenti sempre più trasversali (sugli oggetti) e sempre più “genuinamente quantistici” (inspiegabili con la fisica classica) (**costruzione e definizione del problema**).
3. La ricerca di nuove forme di regolarità, di categorie di pensiero e di strumenti razionali per spiegare ciò che si osserva (**costruzione di una “teoria” che spieghi, interpreti la fenomenologia**)

N.B. La dinamica di “ripulitura” concettuale, terminologica e immaginativa come tipica della fisica...

“No new idea, whatever its domain, is born fully grown. Initial formulations of novel conceptions, being still tributary to the old views they are to replace, of necessity are awkward and inappropriate. Any scientific theory, following its inception, then has to undergo a recasting process through which its notions are clarified and its terms improved.”

JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND, *On the Nature of Quantons*,
2003, *Science & Education*

*Quali aspetti, qui osservabili, "non sono spiegabili" con criteri classici?
A cosa dobbiamo rinunciare?*

Come interpretate queste vignette?

Sull'“ovvio” concetto di traiettoria...

La “relazione” di indeterminazione

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

“h tagliato” = $1,054 \times 10^{-34} \text{Js}$

Apparentemente...

“[...] una formuletta - in sé piuttosto arida e arcana - che abbiamo imparato a recitare sui libri di Liceo, dal nome fastidiosamente indimenticabile: il principio di indeterminazione di Heisenberg.”

(M. Cattaneo, Heisenberg e la rivoluzione quantistica, I grandi della scienza, Le Scienze, 2000, ripubblicato luglio 2013)

Figura 35.

Una «nube» di funzione d'onda ψ che si avvicina a due fessure ($t = 0$ e $t = 1$), le attraversa, si divide in due ($t = 2$), si espande e si sovrappone ($t = 3$) e urta lo schermo ($t = 4$).

“Non si deve attaccare alcun significato speciale al cammino dell’ elettrone... e ancor meno alla posizione di un elettrone nel suo cammino.... l’onda...non solo riempie tutto il cammino simultaneamente, ma si estende addirittura notevolmente in tutte le direzioni.” (E. Schrödinger)

Di che onda si tratta????

Osservando la figura di Levy-Leblond e pensando all'ESP,
come interpretate la figura stessa? Cosa vi dice?
(lavoro di gruppo)

Neither Waves, Nor Particles, but Quantons!

That the true nature of quantum objects has long been misunderstood is proved by their still all too common description in terms of an alleged “wave-particle duality”. It must be remarked first of all that this formulation is at best ambiguous. For it may be understood as meaning either that a quantum object is at once a wave and a particle, or that it is sometimes a wave and sometimes a particle. Neither one of these interpretations in fact make sense. “Wave” and “particle” are not things but concepts, and incompatible ones; as such, they definitely cannot characterise the same entity. While it is true that quantum objects may in some cases look like waves, and in other cases like particles, it is truer still that in most situations, particularly the ones explored by the elaborate modern experiments, they resemble neither one nor the other. The situation here is reminiscent of that encountered by the first explorers of Australia, when they discovered strange animals dwelling in brooks. Viewed from the forefront, they exhibited a duckbill and webbed feet, while, seen from behind, they showed a furry body and tail. They were then dubbed “duckmoles”. It was later discovered that this “duck-mole duality” was of limited validity, and that the zoological specificity of these beasts deserved a proper naming, which was chosen as “platypus”. Bunge’s proposal to call them “quantons”, building on the common terminology (electrons, photons, nucleons, etc.) and extending it to a common categorisation, is most to the point, and it is to be hoped that this terminology gradually gains ground.

JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND, On the Nature of Quantons, 2003, *Science & Education*

Niels Bohr

*Stando così le cose, l'attribuzione di qualità fisiche tradizionali agli oggetti atomici implica un **elemento essenziale di ambiguità**, come si vede immediatamente nella contraddizione relativa alle proprietà corpuscolari e ondulatorie degli elettroni e dei fotoni, in cui ci troviamo di fronte a immagini contrastanti, ognuna delle quali si riferisce a un aspetto essenziale dei dati sperimentali.*

(Discussione con Einstein sui problemi epistemologici della fisica atomica, 1949, in Autobiografia scientifica, pp. 113- 114)

ambiguità

Contraria sunt complementa.

L'estensione della fenomenologia:

1. ESPERIMENTI WHICH-PATH (o which-way)

Dr. Quantum

da un punto di vista matematico è persino più strano

Analizzando la struttura concettuale di esperimenti con fotoni...

...analizzerete questo fenomeno "GENUINAMENTE QUANTISTICO" e inizierete a costruire nuovi concetti (stato, sovrapposizione, ampiezza di probabilità...) per poterlo interpretare.

L'estensione della fenomenologia:

2. ESPERIMENTI STERN E GERLACH con atomi d'argento

PROLOGO: I calzini di Erwin*

“Erwin aveva una collezione di calzini molto semplice – bianchi o neri, per andare a scuola o per giocare a pallone, corti o lunghi a seconda che li portasse coi pantaloni o con pantaloncini.

Erwin teneva i calzini in due cassetti. In uno teneva i calzini bianchi e nell’altro quelli neri. Riteneva di poter capire se erano lunghi e corti semplicemente toccandoli.

Sfortunatamente questo modo di organizzare i calzini non funzionava. Ogni volta che dal cassetto “dei calzini bianchi”, estraeva due calze lunghe o due calze corte, c’era una probabilità del 50% che ognuno dei due fosse nero o bianco. I risultati dal cassetto “nero” erano gli stessi. I calzini sembravano aver dimenticato la proprietà che Erwin aveva determinato precedentemente di essere bianchi o neri.

Erwin quindi decise di organizzare i calzini nei cassetti a seconda della lunghezza. C’era in cassetto dei calzini lunghi e quello dei calzini corti.

Quando però da uno dei due cassetti andava a prendere due calze bianche o due calze nere, la probabilità che ognuna di esse fosse lunga o corta era del 50%. Avevano “dimenticato” la proprietà di essere lunghi o corti.”

***liberamente tratto da McIntyre, Manogue, Tate “Paradigms in Physics: Quantum Mechanics”, Oregon State University**

Consegna per riflettere sul filo 2:
ANALISI DEL RACCONTO SUI CALZINI DI ERWIN

Come rappresentereste la logica e la struttura del ragionamento che sta dietro al racconto?

Consegna per la fine del corso: Provate a scrivere un racconto, un fumetto, a fare un video in cui si racconti una storia che abbia la stessa logica e dia lo stesso messaggio del racconto dei calzini, ma senza parlare di calzini.

L'estensione della fenomenologia:

3. APPLICAZIONI DELLA FISICA QUANTISTICA (crittografia, teletrasporto e quantum computing)

Il concetto di ENTANGLEMENT...